

## COMMENT PRENDRE MON TRAITEMENT CONTRE L'HEPATITE C

**Mon traitement est une combinaison de 2 ou 3 médicaments.**

L'interféron est une substance naturellement produite par certaines cellules du système immunitaire. Il stimule l'immunité et bloque la multiplication de certains virus.

La ribavirine est une substance antivirale qui augmente les effets de l'interféron.

Le télaprévir est une substance antivirale qui bloque la multiplication du virus de l'hépatite C. Il fait partie de la famille des anti-protéases antivirales.

 **N° Vert** **0 800 004 372**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE



**Je fais mon injection toujours le même jour si possible à la même heure. Une fois/semaine.** (Je peux la faire tout seul ou demander à une infirmière de la faire).

**Tous les ..... à .....**



**EN CAS D'OUBLI:**

Je prends 1 à 2 comprimés 500mg de paracétamol 30 min avant l'injection, et jusqu'à 6 par jour en cas de symptômes pseudo grippaux.

si – de 48 h je fais mon injection et je reprends le jour habituel ensuite, sinon je contacte mon médecin.

**Je stocke mes seringues**

**A la maison :**



Entre 2° et 8°  
Au réfrigérateur



**En déplacement :**

24 h dans un sac réfrigéré disponible chez SOS hépatites

**Je gère mes déchets :**

Je jette ma seringue/ mon stylo dans le collecteur (ne pas jeter à la poubelle).

Je le ramène à la pharmacie

**tous les 3 mois** pour un échange.



**COPEGUS®-OU REBETOL®**

**MON TRAITEMENT RIBAVIRINE**

**MA DOSE JUSTE :**



Le **matin** je prends \_\_\_ cps

Le **soir** je prends \_\_\_ cps

au milieu du petit déjeuner

au milieu du diner



11 à 12h d'intervalles

Avec un aliment gras  
(un yaourt, du chocolat,...)



**EN CAS D'OUBLI :**

Si – de 6 heures, je prends mes comprimés oubliés

Si + de 6 heures, je ne prends pas mes comprimés

**JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE**

**Je stocke mes comprimés :**

à température ambiante,  
hors de portée des enfants  
(ex : placard sous clés,...)




**INCIVO®**


**MON TRAITEMENT TELAPREVIR**

**MA DOSE JUSTE :**

**Au réveil je prends 2 comprimés**



**8 Heures après, je reprends 2 comprimés**



**8 Heures après, je reprends 2 comprimés**



**EN CAS D'OUBLI :**

Si – de 4 heures, je prends mes 2 comprimés oubliés, et je prends les suivants à l'heure prévue normalement.

Si + de 4 heures, je ne prends pas les 2 comprimés oubliés, et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE**

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants



**CHAQUE JOUR**  
**PENDANT 3 MOIS**

**Avec chaque prise**  
je prends un aliment riche en graisses.  
(ex : un yaourt au lait entier, tartine de beurre ou de chocolat...)

**Par exemple :**

à 7h,  
à 15h  
et à 23h



## Quelques conseils et alertes concernant le traitement :

### Je dois utiliser une méthode de contraception.

Votre partenaire et vous devez utiliser deux méthodes de contraception efficaces pendant toute la durée du traitement et pendant les mois qui suivent son arrêt (4 mois pour les femmes et 7 mois pour les hommes).

Utiliser toujours une **double contraception (préservatif masculin ou féminin + pilule)**, le traitement diminue l'efficacité de la pilule.  
Ne pas oublier d'en parler avec votre médecin.

### Je dois hydrater ma peau

Utilisez un savon surgras pour la toilette quotidienne.

Pensez à bien hydrater votre peau, après chaque douche ou bain avec un crème très hydratante.

Si démangeaisons anales : faites une toilette intime après chaque selle, en prenant soin de sécher soigneusement et appliquer une pâte à base d'eau.


### Je dois consulter mon médecin :

Si apparaissent sur la peau : des plaques rouges ou des boutons avec ou sans démangeaisons.

### Je dois consulter en urgence si :

- Mes plaques et mes boutons s'étendent sur tout mon corps et rapidement.
- Apparaissent des cloques ou un décollement de ma peau.
- Un gonflement du visage ou du cou.
- Apparaissent des ganglions.
- Une fièvre supérieure à 38° pendant 2 à 3 jours.
- Une atteinte des muqueuses (bouche, nez, yeux, sexe et anus)

## RAPPELS:



## INTERFERON :

1 injection par semaine le même jour et si possible à la même heure

**ATTENTION :** SI VOUS PRENEZ LES MEDICAMENTS, OU MOLECULES (GENERIQUES) SUIVANTES, parlez-en immédiatement à votre médecin avant le début du traitement (liste non exhaustive)

Molécules	Médicaments
Alfuzosine	Xatral®, Urion®
Amiodarone	Cordarone®
Quinidine	Quinimax®
Flécaïnide et propafénone	Flécaïne®, Rythmol®
Dihydroergotamine	Diergospray®, Ikaran®, Séglor®, Tamik®
Ergotamine	Gynergene caféiné®
Méthylergonovine	Méthergin®
Cisapride	Prépulsid®
Simvastatine	Zocor®, Lodalès®, Inegy®
Atorvastatine	Tahor
Pimozide	Orap®
Sildénafil	Révacio®, Viagra®
Rifampicine	Rifadine®, Rimactan®, Rifater®, Rifinah®
Millepertuis	Mildac® (attention à la phytothérapie en général)
Carmabazépine, Phénytoïne, Phénobarbital	Tégretol®, Di Hydan®, Gardéнал®



# Vos espaces de rencontre, d'accueil et d'écoute en Alsace Lorraine

## En Alsace :



Lieu d'accueil, d'écoute et d'Information,  
23 rue de la 1ère Armée 67000 Strasbourg

Tél : 03 88 24 26 01

Mail : [alsace@soshepatites.org](mailto:alsace@soshepatites.org)

## En Lorraine :



Ecoute et Information

Tél : 03 83 15 37 46

Tél : 06 25 93 18 72

Mail : [meurthe.moselle@soshepatites.org](mailto:meurthe.moselle@soshepatites.org)

<http://alsace.soshepatites.org>

Avec le soutien de :



Document réalisé par SOS hépatites Alsace  
Avec l'aimable autorisation de la Maison du Patient (Lyon)

Février 2012